

Deuron Deuron Deuron Deuron

“優生”治風痛 錠 50 公絲 (本補麻隆)



Deuron Tablets 50mg "Yu Sheng"
(Benzbromarone)

衛署藥製字第 029805 號

GMP G-0697 號

LT-108-DU

【主要成份】：每錠含

Benzbromarone..... 50mg

【適應症】：

痛風、高尿酸血症。

【注意事項】：

一、一般注意事項：

- (1) 急性痛風發作時，勿給藥，俟平靜後投與。
- (2) 投藥初期，由於尿酸之移動，使痛風之發作，有暫時性之增強，故治療初期約一週左右，投藥量一天一錠。
- (3) 為防範尿酸結石，應注意多喝開水，增多尿量，以提高尿之鹼度，以免發生血尿、腎疼痛之症狀。
- (4) 長期投與應作肝功能檢查。
- (5) 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。
- (6) 腎功能異常之患者，建議酌予減量。
- (7) 重度肝功能異常之患者應小心使用。

二、禁忌：

- (1) 高度腎機能障礙及伴隨腎結石之患者。
- (2) 孕婦及可能懷孕婦女。
- (3) 肝功能異常者。

三、副作用

- (1) 過敏症：蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、瘙癢感。
- (2) 肝臟、SGOT、SGPT，Alkaline-phosphatase值均上升。
- (3) 胃腸道：偶有胃痛、腹痛、胃部不快感、胸悶、噁心、下痢、軟便。
- (4) 其他：偶有浮腫、心窩部不快。

四、孕婦投與動物實驗，有催畸形作用，孕婦及可能懷孕婦人儘量避免使用。

五、警語：

(1) 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個用內，應定期進行肝功能檢查。

(2) 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振，全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

【用法・用量】：

通常成人一次一錠，一日2~3次。

宜依年齡、症狀酌減之。

本藥須由醫師處方使用。

【儲存條件】：

儲存於25°C以下。

【包裝】：

6~1000粒/塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

請依說明書、引導文及說明書、請依說明書、請依說明書、請依

優生製藥廠股份有限公司

台中市工業區工業21路14號

MM 04.11

