

Glicron

Glicron

Glicron

Gli

"優生" 惠克糖 錠 80 公絲 (葛立克拉)

Glicron Tablets 80mg "Yu sheng"

(Gliclazide)

衛署藥製字第 030698 號

GMP G-0891

LT-124-GR

【主要成份】

Gliclazide 80mg

【適應症】

糖尿病。

【注意事項】

1. 警告：可能會引起重篤遷延性低血糖症，用法用量使用上須特別留意。

2. 一般的注意：

a 糖尿病的診斷於患者對血糖降下劑適用之考慮，糖尿病以外其耐糖能異常，尿糖陽性糖尿病類似症狀（腎性糖尿、老人性糖尿代謝異常、甲狀腺機能異常等）持有其疾患需留意。

b 適用糖尿病治療，基本食事療法、運動療法，考慮其十分可行性。

c 投與場合上需少量開始，血糖、尿糖須定期檢查並確定藥劑效果，如不十分良好時，速改其他治療法代替。

d 繼續投與，必要投與，須減量投與場合，患者本身不養生，合併感染症等其效果上不十分理想。

須留意食事攝取量，體重增減、血糖值、有無感染等常為可否繼續投與、投與量、藥劑選擇等依據。

e 注意重篤遷延性低血糖起因，低血糖症須十分徹底了解患者家族。

3. 禁忌：

a 昏睡性及昏睡前糖尿病，老年性糖尿病患者。

b 重篤肝、腎機能障害患者。

c 重症感染症、手術前後、重篤外傷患者。

d 下痢、嘔吐等胃腸障害患者。

4. 慎重投與：

a 肝、腎機能障害患者。

b 由低血糖而引起如下狀態患者：

①肝腎機能障害②腦下垂體機能不全、副腎機能不全③營養不良狀態飢餓狀態、不規則食事攝取、食事攝取量不足致衰弱狀態④激烈筋肉運動⑤過度 Ethanol 攝取者⑥高齡者。

c 因低血糖而會引起事故之患者（從事高所作業、汽車駕駛）。

5. 副作用：

- a 低血糖：脫力感、高度空腹感、發汗、心悸亢進、振戰、頭痛、知覺異常，不安興奮、神經過敏、集中力低下、精神障害、意識障害、痙攣等症狀。
- b 血液：可能有貧血、白血球減少現象。
- c 肝臟：可能有肝機能障害。
- d 腎臟：可能有 BUN.Serumcreatinine 上昇現象。
- e 胃腸：可能有食慾不振、嘔吐、噁心等症狀。
- f 過敏症：皮膚瘙癢感發疹如與 Sulfonylurea 藥劑投與，曾有光線過敏症出現報告。
- g 其他：頭重、頭痛、熱感。

6. 妊婦投與：妊娠中投與其安全性尚未確立。

7. 小兒投與：小兒其安全性尚未確立。

8. 相互作用：與其他藥劑併用其對血糖降下作用之增強與減弱需十分觀察投與。

a 增強藥劑：Insulin 製劑 Biguanide.pyrazone 系消炎劑 (phenylbutazone 等)probenecid.Coumarin 系藥劑 Salicylic acid 劑、MAO 阻斷劑、Sulfa drug. Dihydroergotamine 藥。

b 減弱藥劑：副腎皮質藥劑、甲狀腺藥劑、卵泡劑、利尿劑。

9. 其他：Sulfonylurea 系藥劑，長期連續投與及單獨食物療法場合之比較，心血管系障害之死亡率有增高之報告。

10. 室溫保存。

【用法・用量】

劑量按照糖尿病的嚴重程度由醫師決定之。

一般病例每天二錠。

嚴重病例每天三錠。

輕微病例每天一錠。

本藥須由醫師處方使用。

【包裝】

瓶裝 6's—1000's

盒裝 6's—1000's

【代號】

GR-0124



優生製藥廠股份有限公司

台中市工業區工業21路14號

MM 200705